

A

0
0
0
2
8
4
6
3
5
3
3




UC SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY



ATLAS
DE LA
FLORE ALPINE.

Tome. I.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
AT LOS ANGELES






ATLAS

DE LA

FLORE ALPINE

*Publié par le Club alpin allemand
et autrichien.*

Vol. I (Planches 1 à 100).



GENÈVE & BALE
LIBRAIRIE GEORG & C^o

Lyon, même maison.

1899

Tous droits réservés.

Index des planches du tome I.

(Planche 1 — 100.)

Les plantes dont les noms sont accompagnés d'un * sont photographiées d'après nature.

- | | |
|---|--|
| 1. <i>Atrageus alpina</i> L.* | 51. <i>Draba confusa</i> Ehr. |
| 2. <i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.* | 52. » <i>pyrenaica</i> L. |
| 3. » <i>alpinum</i> L.* | 53. <i>Kernera saxatilis</i> Reich.* |
| 4. <i>Anemone narcissiflora</i> L.* | 54. » <i>alpina</i> Prantl. |
| 5. » <i>baldensis</i> L.* | 55. <i>Braya alpina</i> Sterub. |
| 6. » <i>trifolia</i> L.* | 56. <i>Erysimum lanceolatum</i> B. Br.* |
| 7. » <i>vernalis</i> L.* | 57. <i>Aethionema saxatilis</i> R. Br.* |
| 8. » <i>alpina</i> L.* | 58. <i>Biscutella laevigata</i> L.* |
| 9. <i>Callianthemum rutaeifolium</i> C.A.M. | 59. <i>Thlaspi alpinum</i> Crantz.* |
| 10. <i>Callianthemum anemonoides</i> Sch. | 60. » <i>cepaeifolium</i> Moritz.* |
| 11. <i>Ranunculus pyrenaicus</i> L.* | 61. » <i>rotundifolium</i> Gaud.* |
| 12. » <i>parnassifolius</i> L. | 62. <i>Hutchinsia alpina</i> R. Br.* |
| 13. » <i>glacialis</i> L.* | 63. » <i>brevicaulis</i> Hoppe.* |
| 14. » <i>Segneri</i> Vill. | 64. <i>Helianthemum alpestre</i> DuR.* |
| 15. » <i>alpestris</i> L.* | 65. » <i>hirsutum</i> A. Kern.* |
| 16. » <i>aconitifolius</i> L.* | 66. <i>Viola pinnata</i> L.* |
| 17. » <i>Thora</i> L.* | 67. » <i>biflora</i> L.* |
| 18. » <i>Pythora</i> Crantz. | 68. » <i>alpina</i> Jacq.* |
| 19. » <i>pygmaeus</i> Wahl. | 69. » <i>cenisia</i> L.* |
| 20. » <i>montanus</i> Willd.* | 70. » <i>calcarata</i> L.* |
| 21. <i>Trollius europaeus</i> L.* | 71. <i>Polygala Chamæbuxus</i> L.* |
| 22. <i>Eranthis hiemalis</i> Salisb. | 72. » <i>microcarpa</i> Gaud.* |
| 23. <i>Helleborus niger</i> L.* | 73. <i>Dianthus monspessulanus</i> L.* |
| 24. <i>Aquilegia atrata</i> Koch.* | 74. » <i>Sternbergii</i> Sieb.* |
| 25. <i>Delphinium elatum</i> L.* | 75. » <i>alpinus</i> L.* |
| 26. <i>Aconitum Napellus</i> L.* | 76. » <i>glacialis</i> Hænke. |
| 27. » <i>Anthora</i> L.* | 77. <i>Gypsophila repens</i> L. |
| 28. <i>Paeonia peregrina</i> Mill.* | 78. <i>Saponaria ocynoides</i> L. |
| 29. <i>Papaver alpinum</i> L.* | 79. <i>Silene Pumilio</i> Wulf. |
| 30. » <i>pyrenaicum</i> Willd. | 80. » <i>alpestris</i> Jacq.* |
| 31. <i>Arabis alpina</i> L.* | 81. » <i>rupestris</i> L.* |
| 32. » <i>coerulea</i> (All.) Hænke.* | 82. » <i>Saxifraga</i> L.* |
| 33. » <i>pumila</i> Wulf.* | 83. » <i>acaulis</i> L.* |
| 34. » <i>bellidifolia</i> Jacq.* | 84. <i>Lycnisis alpina</i> L. |
| 35. » <i>arenosa</i> Scop.* | 85. <i>Cerastium trigynum</i> Vill. |
| 36. » <i>Halleri</i> L.* | 86. » <i>glaciale</i> Gaud.* |
| 37. <i>Cardamine arifolia</i> L. | 87. » <i>carinthiacum</i> Vest.* |
| 38. » <i>alpina</i> Willd.* | 88. <i>Arenaria biflora</i> L. |
| 39. » <i>trifolia</i> L.* | 89. » <i>ciliata</i> L.* |
| 40. » <i>resedifolia</i> L.* | 90. » <i>grandiflora</i> L. |
| 41. <i>Dentaria enneaphyllos</i> L.* | 91. <i>Mœhringia muscosa</i> L. |
| 42. » <i>digitata</i> Lam.* | 92. » <i>Ponæ</i> Fenzl.* |
| 43. <i>Alyssum Wulfenianum</i> Bernh. | 93. <i>Alsine sedoides</i> Kit. (Cherl. sed.)* |
| 44. <i>Draba aizoides</i> L. | 94. » <i>lanceolata</i> M. K. |
| 45. » <i>Sauteri</i> Hoppe.* | 95. » <i>laricifolia</i> Crantz. |
| 46. » <i>tomentosa</i> Wahl.* | 96. » <i>recurva</i> Wahl. |
| 47. » <i>frigida</i> Saut. | 97. » <i>austriaca</i> M. K. |
| 48. » <i>stellata</i> Jacq. | 98. <i>Sagina glabra</i> Koch. |
| 49. » <i>carinthiaca</i> Hoppe.* | 99. <i>Myricaria germanica</i> Desv.* |
| 50. » <i>Fladnizensis</i> Wulf. | 100. <i>Linum alpinum</i> L.* |



1. *Atragene alpina*, L. — Alpenrebe.

Atragène des Alpes. — Alpine Clematis.

Chaine des Alpes, Tyrol, Grisons, Alpes françaises et piémontaises. Mai - Juin.



2. *Thalictrum aquilegifolium*, L. — Akeleiblättrige Wiesenraute.
 Pigamon. — Meadowrue.

Lieux frais des montagnes. Avril — Juin.



3. *Thalictrum alpinum*, L. — Alpen-Wiesenraute.
Pigamon alpin. — Alpine Meadowrue.

Alpes centrales, dans les lieux frais. Juin — Août.



4. *Anemone narcissiflora*, L. — Narcissen-Windröschen.
 Anémone à fleurs de narcisse. — Narcisse flowered Windflower.

Alpes calcaires du Val de Saône, Jura, Juvilly.



5 *Anemone baldensis*, L. — Monte Baldo-Windröschen.
 Anémone du Mont Baldo. — Monte Baldo Windflower.

Disseminée dans les pâturages rocheux de la région alpine.



6 *Anemone trifolia*, L. — Dreiblättriges Windröschen.
Sylvie alpine. — Alpine Woodanemone.

Regions montagneuses et boisées des Alpes orientales, occidentales et méridionales



7. *Anemone vernalis*, L. — Frühlings-Küchenschelle.
Anémone des neiges. — Vernal Windflower.

Pâturages élevés des Alpes granitiques. Avril — Juin.



8. *Anemone alpina*, L. — Alpen-Küchenschelle.

Anémone des Alpes. — Alpine Windflower.

Pâturages et lieux frais des régions sous alpines et montagneuses dans les alpes calcaires. Mai — Juillet.



9. *Callianthemum rutaefolium*, C. A. Mey. — Rautenblättrige Schmuckblume.

Calianthème à feuilles de Rue. — Rue leaved crowfoot.



10. *Callianthemum anemonoides*, Schott. — Windröschen ähnliche Schmuckblume.

Calianthème à fleurs d'Anémone. Anemone flowered crowfoot.

Alpes, colonies d'Anémone, dans les forêts de sapin.



11 *Ranunculus pyrenaicus*, L. — Pyrenäischer Hahnenfuss.
Renoncule des Pyrénées. — Pyrenean crowfoot.

Pâturages élevés de la chaîne alpine Mai — Juillet



12. *Ranunculus parnassifolius*, L. — Studenröschenblättriger Hahnenfuss.

Renoncule à feuilles de Parnassie. — Parnassileaved crowfoot.

Eboulis calcaires des Alpes. — Juni — Août.



13 *Ranunculus glacialis*, L. — Gletscher-Hahnenfuss.
Renoncule des glaciers. — Glacier's crowfoot.

Haute région des Alpes, dans les lieux frais et ombrés. Juillet - Août.



14. *Ranunculus Seguieri*, Vill. — Seguer's Hahnenfuss.

Renoncule de Seguer. — Seguer's crowfoot.

Alpes calcaires du Dauphiné, du Midi de la France, du Tyrol meridional. Juillet — Août.



15. *Ranunculus alpestris*, L. — Alpen-Hahnenfuss
Renoncule alpestre. — Alpine crowfoot.

Lieux élevés et frais des Alpes calcaires. Juin — Août.



16. *Ranunculus aconitifolius*, L. — Eisenhutblättriger Hahnenfuss.
Bouton d'argent. — Single fair Maid of France.

Régions montagneuses de la chaîne alpine, dans les lieux frais. Mai — Septembre.



17. *Ranunculus Thora*, L. — Giftiger Hahnenfuss.

Renoncule vénéneuse. — Poisonous crowfoot.

Régions montagneuses des Alpes calcaires méridionales. Juin -- Juillet.



18 *Ranunculus Pythora*, Crantz — Tödlicher Hahnenfuss.
Renoncule hybride — Hybrid crowfoot

Apocynaceae — *Renoncule* et *pythore* — *Hybride* — *Hybride*



19 *Ranunculus pygmaeus*, Wahlbg. — Zwerghahnenfuss.

Renoncule pygmée. — Minute crowfoot.

Alpe granitica de Tyrol; de l'Herzegovine; de la région alpine. Juillet - Août.



20. *Ranunculus montanus*, Willd. — Berg-Hahnenfuss.
 Renoncule des montagnes. — Mountain crowfoot.

Pâturages de régions montagneuses et alpines. Juin — Septembre.



21. *Trollius europaeus*, L. — Trollblume.

Trolle. — Globeflower.

Prairies humides de la zone subalpine et montagnaise. Mai — juillet.



22. *Eranthis hiemalis*, Salisb. — Winterblume.

Hellébore jaune. — Winter-Aconite.

Alpes del'Autriche méridionale, dans les taillis de la région montagnieuse. Février Mars



23. *Helleborus niger*, L. — Schwarze Niesswurz.

Rose de Noël. — Christmas Rose.

Alpes orientales et italiennes, dans les taillis rocheux, janvier — Mars.



24. *Aquilegia atrata*, Koch.— Dunkelblumiger Akelei.
Ancolie sombre. — Dark Columbine.

Lieux frais des régions montagneuses. Mai—Juin.



25. *Delphinium elatum*, L. — Hoher Rittersporn.

Dauphinelle alpine. — Alpine larkspur.

Lieux frais et pierreux de la région subalpine. Juillet — Août.



26. *Aconitum Napellus*, L. — Gemeiner Eisenhut.
 Char de Vénus, Casque de Jupiter. — Monkshood.

Régions montagneuses de la chaîne alpine. Juillet Septembre



27. *Aconitum Anthora*, L. — Giftheil Eisenhut.

Aconit vénéneux. — Yellow Monkshood.

Pâturages rocailleux des Alpes calcaires. Juillet — Octobre



28. *Paeonia peregrina*, Mill. — Pfingstrose.

Pivoine. — Paeony.

Pentes meridionales des Alpes du Tyrol et d'Italie, dans les lieux rocheux et les taillis de la région montagnaise. Mai - Juin.



29 *Papaver alpinum*, L. — Alpenmohn.

Pavot des Alpes. — Alpine poppy.

Froulis rocheux de la chaîne alpine. Juin — Septembre.



30. *Papaver pyrenaicum*, Willd. — Pyrenäen Mohn.

Pavot des Pyrénées. — Pyrenean poppy.

Rochers et éboulis des Alpes orientales et occidentales. Juin — Août.



31. *Arabis alpina*, L. — Alpen-Gänsekresse.

Arabette des Alpes. — Alpine Rock cress.

Lieux frais et rocaillieux des Alpes, surtout calcaires. — Avril — Août



32 *Arabis coerulea*, Hänke — Blaue Gänseblümche
 Arabette bleue. — Blue Rock cress

Prodes les rochers et en les gorges (Alpes) — Italie, Autriche.



33. *Arabis pumila*, Jacq. — Zwerg-Gänsekresse.

Arabette naine. — Zwerg-Rock cress.

Chaine alpine, fissures des rochers et éboulis. Juin — Août.



34. *Arabis bellidifolia*, Jacq. — Maassliebchenblättrige Gänsekresse.
 Arabette à feuilles de Pâquerettes. — Daisyleaved Rock cress.

Lieux frais et humides des Alpes, pierriers, etc. Juin — Août.



35 *Arabis arenosa*, Scop. — Sand-Gänsekresse.

Arabette des sables. — Sand Rock cress.

Lieux rocailleux et frais des Alpes calcaires. Avril—Septembre.



36. *Arabis Halleri*, L. — Haller's Gänsekresse.
 Arabette de Haller. — Haller's Rock cress.

Lieux frais de montagne, es alpestres. — Mai — juillet.



397111

37. *Cardamine asarifolia*, L. — Haselwurzblättriges Schaumkraut.
Cresson à feuilles d'Asarum. — Asaraleaved Lady's Smock.

Alpes d'Italie et du Tyrol méridional. Juin — Juillet.



38. *Cardamine alpina*, Willd. — Alpen-Schaumkraut.
Cresson des Alpes. — Alpine Lady's Smock.

Talès de régions alpines et subalpines. Juin - Août



39. *Cardamine trifolia*, L. — Dreiblättriges Schaumkraut.
Cresson trifolié. — Threeleaves Lady's Smock.

Taillis rocheux des Alpes orientales calcaires. Avril — Juin.



40. *Cardamine resedifolia*, L. — Resedenblättriges Schaumkraut.
Cresson à feuilles de Réséda. — Mignonette leaved Lady's Smock

Lieux humides et pierreux des régions alpines. Juin - Septembre.



41. *Dentaria enneaphyllos*, L. — Neunblättrige Zahnwurz.
Dentaire à neuf feuilles. — Nineleaves Toothwort.

Alpes d'Australie, dans les bois de la région inférieure. Avril. 1914.



42. *Dentaria digitata*, Lam. — Gefingertblättrige Zahnwurz.
Dentaire digitée. — Purple Toothwort.

Régions montagneuses et boisées des Alpes calcaires. Avril — Juin



43. *Alyssum Wulfenianum*, Bernh. — Wulfen's Steinkraut
 Alysse de Wulfen. — Wulfen's Madwort.

Pentes sèches et pierreuses des Alpes orientales et méridionales. Juillet — Août.



44. *Draba aizoides*, L. — Immergrünes Hungerblümchen.

Drave des rochers. — Whitlowgrass.

Feutes des rochers des régions alpines et montagneuses. Mai - Juillet.



45. *Draba Sauteri*, Hoppe. — Sauter's Hungerblümchen.
 Drave de Sauter. — Sauter's Whitlowgrass.
 Alpes orientales valaisannes. — Ferriers et toute des rochers. Juin — Juillet.



46. *Draba tomentosa*, Wlbg. — Filziges Hungerblümchen.
Draba tomenteux. — Silverleaved Whitlowgrass.

Fentes des rochers calcaires dans la région alpine. Juin — Août.



47. *Draba frigida*, Saut. — Kälteliebendes Hungerblümchen.
 Drave des glaciers. — Glacier's Whitlowgrass.
 Rochers et pierriers des hautes régions alpines. Juillet — Août.



48. *Draba stellata*, Jacq. -- Sternhaariges Hungerblümchen.
 Drave étoilée. — Starleaved Whitlowgrass.

Rochers calcaires de la région alpine. Juillet — Août.




49. *Draba carinthiaca*, Hoppe. — Kärtner Hungerblümchen.
Drave de Carinthie. — Carinthian Whitlowgrass.

Fentes des rochers de la région alpine. Juin — Août



50. *Draba fladnizensis*, Wulf — Fladnizer Hungerblümchen
 Drave de Fladnizer. — Fladnizer's Whilowgrass.
 Riedel, *montagnes des Alpes dans le sud-est de l'Autriche*.



51 *Draba confusa*, Ehrh. — Verkanntes Hungerblümchen.

Drave duveteuse. — Woolly Whitlowgrass.

Pechers de la région montagneuse. Mai—Juin



52. *Draba pyrenaica*, L. — Steinschnücker.

Drave rose. — Pyrenean Whitlowgrass.

Rochers et pierriers des Alpes calcaires dans la région alpine. Juin — Juillet.



53. *Kerneria saxatilis* (L.), Rchb. — Felsen-Kugelschötchen.
Cranson. — Cranson.

Fissures des rochers calcaires dans la région montagneuse Mai — Août



54. *Kerneria alpina*, Prantl. — Alpen-Kugelschötchen.

Cranson autrichien. — Austrian cranson.

Rochers des Alpes tyroliennes méridionales, dans la région alpine. Juillet—Août



55. *Braya alpina*, Sternb. — Alpen-Kugelschötchen.

Rochers et pierriers de la région alpine dans le massif du Glockner et du Solstein (rare).
Juillet — Août.



56 *Erysimum lanceolatum*, R. Fr. — *G. Goldweide*-Fiederich.
Velar jaune. — Mountain Wallflower.

Pl. des Alpes et des Pyrénées, région n. n. française (Alpes). — Août — Juin. — M. O. J. H. C.



57. *Aethionema saxatile*, R. Br. — Steintäschel.

Aethionème des rochers. — Rock's *Aethionema*.

Petites pierieuses des Alpes, ici et là, dans la région méditerranéenne et sous-équinoxiale.



58. *Biscutella laevigata*, L. — Brillenschötchen.
Lunetière. — Biscutelle.

Pâturages rocailloux de la chaîne alpine. Mai — Août.



59. *Thlaspi alpinum*, Crantz. — Alpen-Täschelkraut.

Tabouret des Alpes. — Alpine Bastard cress.

Pâturages et rocaïlles de la région montagnaise et sous alpine. Juin — Août.



60. *Thlaspi cepeaefolium*, Koch. — Fetthennblättriges Täschelkraut.
Tabouret violet. — Purple Bastard cress.

Pierriers des Alpes granitiques centrales, meridionales et orientales. Mai — Juillet.



61. *Thlaspi rotundifolium*, Gaud. — Rundblättniges Felsch-Wraut
Tabouret à feuilles rondes. — Roundleaved bastard cress.

Fig. 1. — 2. *Thlaspi rotundifolium* (Gaud.) — 3. *Thlaspi*



62. *Hutchinsia alpina*, R. Br. — Alpen-Felsenkresse.

Hutschinsie des Alpes. — Alpine Hutschinsie.

Lieux frais des rochers calcaires dans la région alpine et montagneuse. Juin — Août.



63. *Hutchinsia brevicaulis*, Hoppe. = Kurzstenglige Felsenkresse.
 Hutchinsia à courte tige. — Shortstemed Hutchinsie.

* Rochers frais des Alpes granitiques. Juillet — Août.



64. *Helianthemum alpestre*, Dun. — Alpen-Sonnenröschen.
 Hélianthème des Alpes. — Alpine Rockrose.
 Rochers de la zone sous alpine et montagnaise. Juin — Août.



65. *Helianthemum hirsutum*, A. Kern. — Rauhhaariges Sonnenröschen.

Hélianthème velu. — Hairy Rockrose.

Pâturages et coteaux de la région méditerranéenne. — Lés. A. 51.



66. *Viola pinnata* L. — Fingerblättrige Veilchen.
Violette pennée. — Pinnate violet.

Flora picta des auteurs de la *Flora picta* de la France, par J. B. Lamarck.



67. *Viola biflora*, L. — Zweiblüthiges Veilchen.

Violette jaune. — Yellow Violet.

Lieux frais et ombragés de la chaîne alpine. Mai — Août.



68. *Viola alpina*, Jacq. — Alpenveilchen.

Pensée tyrolienne. — Tyrolian Pansy.

Alpes calcaires de l'Autriche dans les pâturages rocheux de la région alpine et sous alpine,
Juin — Août.



69. *Viola cenisia*, L. — Mont Cenis-Veilchen

Pensée du Mt. Cenis. — Pansy of the Mt. Cenis.

Eboul. des Alpes occidentales (vallées françaises et occidentales), dans l'écrin alpin. — Juillet — Août.



70 *Viola calcarata*, L. — Gesporntes Veilchen.
Pensée des Alpes. — Alpine pansy.

Pâturages de la région alpine. Juin — Août.



71. *Polygala Chamaebuxus*, L. — Buchsbaumblättrige Kreuzblume.
Faux-Buis. — Boxleaved milkwort.

Région boisée montagneuse des Alpes. Décembre — Avril.



72 *Polygala microcarpa* Gaud. — Kleinfrüchtige Kreuzblume.

Polygale à petit fruit. — Blue milkwort.

Sur les pentes de la montagne et sous abîme. Mai — Août.



73. *Dianthus monspessulanus*, L. — Montpellier'sche Nelke.
Oeillet de Montpellier. — Pink of Montpellier.

Region montagnarde et sub-alpine des Alpes occidentales et méridionales. Juillet — Août.



74. *Dianthus Sternbergii*, Sieb. — Sternberg's Nelke.

Oeillet de Sternberg. — Pink of Sternberg.

Pât. racés cailloux et pierriers de la zone alpine dans les Alpes méridionales et orientales.
Juillet — Août.



75 *Dianthus alpinus*, L. — Alpennelke.

Oeillet des Alpes. — Alpine pink.

Plumet. — *Stachys*. — *V. c. alpinus*. — *mentales*. — *Jui*. — *Acut*.



76. *Dianthus glacialis*, Hänke. — Gletschernelke.

Oeillet des glaciers. — Glaciers' Pink.

Pâturages élevés des Alpes granitiques cristallines. Juillet — Août.



77. *Gypsophila repens*, L. — Kriechendes Gypskraut.

Gypsophile alpine. — Alpine gypsophile.

Lieux rocheux des Alpes calcaires de la région alpine jusque dans les plaines. Mai — Octobre.



79. *Silene Pumilio*, Wulf. — Zwergnelke.

Silène du Tyrol. — Dwarf Catchfly.

Alpes orientales, dans les pierriers et rochers de la région alpine. Juillet - Août.





80. *Silene alpestris*, Jacq. — Alpen-Strahlensame.

Silène alpestre. — Alpine Catchfly.

Alpes orientales; lieux humides des rochers. Juin — Septembre.





SI *Silene rupestris*, L. = Felsen-Linnkraut
Silene des rochers = Rock-Catchfly



82. *Silene Saxifraga*, L. — Steinbrech-Leimkraut
Silene Saxifraga. — Saxifrage Catchfly.

Rothens (see above) *meridionalis* (see above) *identical*. July—Aug.





83. *Silene acaulis*, L. — Stengellose Linnéaut

Silène acatule ou Mousse rose — Cuhson Pink

Portages nord-ouest et nord-est — Juin — Août



84. *Lychnis alpina*, L. — Lichtnelke.

Lychnide des Alpes. — Alpine Campion.

Pâturages élevés de la chaîne alpine (surtout granitique). Juin — Août.



85 *Cerastium trigynum*, Vill. — Dreigriffeliges Hornkraut.
 Céraiste à trois styles. — Threestyled Mouse-ear Chickweed
 Lieux frais et humides de la région montagnueuse. — Juillet - Août.



86. *Cerastium glaciale*, Gaud. — Einblüthiges Hornkraut.
Céraiste des glaciers. — Glaciers' Mouse-ear.


Moraines et pierriers des zones élevées. Juillet—Septembre.



87. *Cerastium carinthiacum*, Vest. — Kärtner Hornkraut.

Céraiste de Carinthie. — Carinthian' Mouse-ear.

Pierriers et rochers de la région alpine dans les Alpes orientales. — Juin — Août



88. *Arenaria biflora*, L. — Zweiblütiges Sandkraut.

Sabline à deux fleurs. — Twofloowered Sabline.

Rochers humides et pierriers frais de la région alpine. Juillet—Août.



89. *Arenaria ciliata*, L. — Gewimpertes Sandkraut.
Sabline ciliée. — Ciliate Sabline.

Rochers et pierriers des alpes calcaires dans la région alpine. Juillet—Août.




90. *Arenaria grandiflora*, All. — Grossblüthiges Sandkraut.
 Sabline à grandes fleurs. — Largeflowered Sabline.

Pâturages rocheux et rocailles de la région subalpine. Juillet — Août.



91. *Möhringia muscosa*, L. — Moosartige Nabelmiere.
Méringie. — Moerengy.

Rocailles et fentes rocheuses à l'ombre et au frais dans la région montagneuse. Mars — Septembre.



92 *Mochringia Ponaë*, Fenzl. — Pona's Nabelmiere.
Méringie de Pona. — Pona's Moerengy.

Vp. — Valais, du Tyrol et de la Styrie dans les rochers de la région montagneuse. — Hb. — Herb.



93. *Alsine sedoides*, Kitt. — Mauerpfeffer-Miere.
Charlérie. — Cherlery.

Pâturages rocheux des hautes altitudes, surtout sur le granit. Juillet — Août



94. *Alsine lanceolata*, M. K. — Lanzettblättrige Miere.

Alsine lancéolée. — Lanceolate Alsine.

Alpes orientales et occidentales dans les rochers de la région montagneuse et alpine. Juillet—Août.



95. *Alsine laricifolia*, Crantz. — Lärchenblättrige Miere.
 Alsine à feuilles de Mélèze. — Larchleaved Alsine.

Rochers et pierriers de la zone montagnaise. Juillet — Septembre.



96. *Alsine recurva*, Wahl. — Krummblättrige Miere.

Alsine à feuilles recurvées. — Recurvateleaved *Alsine*.

Rocailles de la région alpine et montagnaise dans les Alpes orientales, méridionales et occidentales.



97. *Alsine austriaca*, M. K. — Österreichische Miere.

Alsine d'Autriche. — Austrian *Alsine*.

Rochers et pierriers des Alpes (alpes orientales). Juin — Août.



98. *Sagina glabra*, Koch. — Kriechendes Mastkraut.
Sagine glabre. — Glabrous Sagine.

Lieux frais et humides des régions élevées et montagneuses. Juillet — Août.



99. *Myricaria germanica*, Desv. — Deutsche Tamariske.

Tamarix des rivières. — Rivers' Tamarisc.

Riviers M. Knappeux dans les Vallées des Alpes. Mai—Août.



100. *Linum alpinum*, L. — Alpenlein.

Lin des Alpes. — Alpine Flax.

Pentes herbeuses et ensoleillées des Alpes dans la région montagneuse et alpine. Juin — Août.

THE UNIVERSITY LIBRARY

This book is DUE on the last date stamped below

DEC 28 1965

RECEIVED
LD

DEC 15 1965

FM

AM

7-4

4-9

5 10

REC'D COL. LIB.

DEC 17 1965

BIOMED APR 2 '75
BIOMED LIB.

APR 3 REC'D

CD

Form L-9
20m-1, '42(8519)

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
AT
LOS ANGELES
LIBRARY

K
297
D48a
1899
atlas
v.1

Deutscher
und öster-
reichischer
Alpenverein
- Atlas de
la flore
alpine.

UC SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY



A 000 284 653 3

QK
297
D48a
1899
atlas
v.1

